


ICS 11.020
C 60



中华人民共和国国家标准

GB 16382—1996

职业性皮肤病诊断标准及 处理原则

Diagnostic criteria and principles of
management of occupational ulcers

1996-05-23 发布

1996-12-01 实施

国家技术监督局
中华人民共和国卫生部

发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
职业性皮肤溃疡诊断标准及
处理原则

GB 16382—1996

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1996年10月第一版 2005年1月电子版制作

*

书号：155066·1-13118

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

职业性皮肤病诊断标准及 处理原则

GB 16382—1996

Diagnostic criteria and principles of management of occupational ulcers

职业性皮肤病是指生产劳动中直接接触某些铬、铍、砷等化合物所致形态较特异、典型的呈鸟眼状、病程较慢性的皮肤溃疡,如铬溃疡(铬疮)、铍溃疡等。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了职业性皮肤病的诊断标准及处理原则。

本标准适用于职业性接触铬、铍、砷等化合物所致特异性皮肤溃疡的诊断及处理,不适用于职业性化学性皮肤灼伤、烧伤、冻伤等病所致或其他继于血运障碍所致皮肤溃疡的诊断及处理。

2 诊断原则

根据明确的职业接触史、特殊的皮肤表现,结合作业环境劳动卫生调查资料,排除其他类似的皮肤损害,方可诊断。

3 诊断标准

皮损初起多为局限性水肿性红斑或丘疹,继之中心演变成淡灰色或灰褐色坏死,并于数天内破溃,绕以红晕。而后溃疡四周逐渐高出皮面。典型的溃疡多呈圆形,直径约2~5 mm,表面常有少量分泌物,或覆以灰黑色痂,周边为宽2~4 mm的质地坚实的暗红色堤岸状隆起,使整个皮损状似鸟眼。恢复过程中炎症逐渐消退,溃疡变浅、缩小、愈合,最后堤岸状隆起逐渐变平,遗留轻度萎缩性疤痕。

如继续接触,溃疡难以愈合,病程可长达数月乃至年余。

溃疡可有轻度压痛;疼痛一般不明显,但可于接触强刺激物后加重。

4 治疗原则

及时清除皮肤上残留的致病物;清洁创面,对症治疗。

5 劳动能力鉴定

职业性皮肤病一般不影响劳动力。在加强防护的情况下,可继续从事原工作。

6 健康检查的要求

从事铬、铍等化合物作业工人应作就业前体检;就业后每1~2年进行皮肤科检查一次。

7 职业禁忌证

暴露部位严重的慢性皮肤病。