


ICS 67.080.10  
B 33



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18010—1999  
eqv ISO 6477:1988

---

## 腰果仁 规格

Cashew kernels—Specification

1999-11-10 发布

2000-04-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## 前 言

本标准等效采用国际标准 ISO 6477:1988《腰果仁——规格》。与 ISO 6477:1988 比较,主要增加了“抽样”和“检验结果的评定”部分的内容,从而使本标准更加完整。考虑到腰果仁在国际贸易中仍常使用英制单位,本标准白色整仁规格同时使用了公制和英制,随着腰果仁消费国家逐步使用公制,英制应从标准中删除。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国热带农业科学院华南热带农产品加工设计研究所。

本标准主要起草人:王少雄、张毅。

本标准委托农业部热带作物及制品标准化技术委员会负责解释。

## ISO 前言

ISO(国际标准化组织)是国家标准团体(ISO 的成员团体)在世界范围内的联合组织。国际标准的制定工作通常是通过 ISO 的技术委员会进行的,每一个成员团体如果对已设立技术委员会的某一项目感兴趣,都有权派代表参加该委员会。政府的和非政府的国际组织,凡与 ISO 有联系的,也参与了这项工作。ISO 在电工标准化的各项工作中都与国际电工委员会(IEC)紧密合作。

被技术委员会通过的国际标准草案,要经过各成员团体进行投票表决。只有当参加投票表决的成员团体中至少有 75%赞成时,标准才会被批准。

国际标准 ISO 6477:1988 是由 ISO/TC 34 农产食品技术委员会制定。

使用者应注意到所有的国际标准经常进行修订,除非另有说明,这里引用的任何其他国际标准都是指的最新版本。

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18010—1999  
eqv ISO 6477:1988

## 腰果仁 规格

### Cashew kernels—Specification

---

#### 1 范围

本标准规定了由腰果树(*Anacardium Occidentale* Linnaeus)的果实得到的,用于人类食用的果仁的质量标准、检验方法、包装、标志及贮运要求。

本标准适用于完整腰果仁和碎腰果仁。

#### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 5009.3—1985 食品中水分的测定方法

GB/T 6005—1997 试验筛 金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板筛孔的基本尺寸  
(eqv ISO 565:1990)

#### 3 定义

本标准采用下列定义。

腰果仁

腰果树的果实经焙烤、剥壳和去种皮后得到的产品。

#### 4 要求

4.1 腰果仁由腰果脱壳、去种皮后得到,具有特有外形。可以是白色、微黄或焦黄的,可以是完整果仁或碎果仁。不得有霉变、虫蛀,也不得有死活昆虫、虫卵以及石头、土块等杂质。

腰果种皮脱除干净,具特有风味,无脂肪酸败味、馊味等异味。

4.2 腰果仁中水分含量不超过5%(*m/m*)。

4.3 腰果仁应符合表1~表6分级标准的规定。