

ICS 11.020
C 59



中华人民共和国国家标准

GB 15984—1995

霍乱诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and principles of management of cholera

1996-01-23 发布

1996-07-01 实施

国家技术监督局 发布
中华人民共和国卫生部

中华人民共和国国家标准

霍乱诊断标准及处理原则

GB 15984—1995

Diagnostic criteria and principles of management of cholera

霍乱是由 01 群和 0139 群霍乱弧菌引起的急性肠道传染病,是发病急、传播快、波及面广、危害严重的甲类传染病,也是当今三种国际检疫传染病中最严重的一种。

根据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国传染病防治法实施办法》的规定,制定本病的诊断标准及处理原则。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了霍乱的诊断标准,对病人、疫点、疫区的处理原则等,并推荐了对霍乱的病原学检查、血清免疫学检查、霍乱弧菌的鉴定和分型方法以及对病人的补液疗法等。

本标准适用于全国各级卫生防疫、医疗保健机构对由 01 群和 0139 群霍乱弧菌引起的霍乱的诊断和处理。

2 诊断原则

根据夏秋季节霍乱流行期间的疫区内,凡有腹泻,伴有呕吐,从粪便或吐泻物检出 01 群或 0139 群霍乱弧菌或血清检查对 01 群或 0139 群霍乱弧菌的抗体有明显升高者予以诊断。病人的临床症状可由轻度到重度不等。

3 诊断标准

3.1 疑似霍乱诊断标准

a. 凡有典型临床症状,如剧烈腹泻,水样便(黄水样、清水样、米泔样或血水样),伴有呕吐,迅速出现严重脱水,循环衰竭及肌肉痉挛(特别是腓肠肌)的首发病例,在病原学检查尚未肯定前。

b. 霍乱流行期间有明确接触史(如同餐、同住或护理者等),并发生泻吐症状,而无其他原因可查者。

具有上述项目之一者诊断为疑似霍乱。

3.2 确定诊断标准

a. 凡有腹泻症状,粪便培养 01 群或 0139 群霍乱弧菌阳性;

b. 霍乱流行期间的疫区内,凡有霍乱典型症状(见 3.1a),粪便培养 01 群和 0139 群霍乱弧菌阴性,但无其他原因可查者;

c. 在流行期间的疫区内有腹泻症状,作双份血清抗体效价测定,如血清凝集试验呈 4 倍以上或杀弧菌抗体测定呈 8 倍以上增长者;

d. 在疫源检查中,首次粪便培养检出 01 群或 0139 群霍乱弧菌前后各 5 天内有腹泻症状者。

临床诊断:具备 b。

确诊病例:具备 a 或 c 或 d。