



中华人民共和国国家标准

GB 17149.6—1997

化妆品光感性皮炎诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and principles of management
of photosensitive dermatitis induced by cosmetics

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 GB/T 17149.6—1997。

1997-12-15 发布

1998-12-01 实施

国家技术监督局 发布
中华人民共和国卫生部

前 言

为配合中华人民共和国《化妆品卫生监督条例》的实施特制定本标准。

本标准规定的诊断标准和治疗原则仅涉及化妆品引起的光感性皮炎。

本标准从 1998 年 12 月 1 日起实施。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准的附录 B 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准起草单位：解放军空军总医院、大连医学院第二附属医院、南京医学院第一附属医院、北京协和医院。

本标准主要起草人：黄畋、蔡瑞康、刘玮、赵辨、袁兆庄。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

中华人民共和国国家标准

化妆品光感性皮炎诊断标准及处理原则

GB 17149.6—1997

**Diagnostic criteria and principles of management
of photosensitive dermatitis induced by cosmetics**

化妆品光感性皮炎是指使用化妆品后,又经过光照而引起的皮肤炎症性改变,它是化妆品中的光感物质引起的皮肤粘膜的光毒反应或光变应反应。

1 范围

本标准规定了化妆品光感性皮炎的诊断及处理原则。
本标准适用于化妆品引起的光感性皮炎。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 17149.2—1997 化妆品接触性皮炎诊断标准及处理原则

3 诊断原则

有明确的化妆品接触史,又经过光照而在相应部位出现光感性皮炎。必要时可结合光斑贴试验,见附录 A,排除非化妆品引起的光感性皮炎。

4 诊断标准

- 4.1 有明确的化妆品接触史和光照史。
- 4.2 皮损主要发生于曾使用化妆品后的光照部位。
- 4.3 皮损形态多样,可出现红斑、丘疹、小水泡。自觉症状瘙痒;慢性皮损可呈浸润、增厚、苔癣化等。
- 4.4 发生在口唇粘膜时可表现为肿胀、干裂、渗出等,下唇发病多见或较重。
- 4.5 病程可迁延,停用化妆品后仍可有皮疹发生,再接触光敏物质后可再发病。
- 4.6 化妆品光斑贴试验阳性,见附录 A。
- 4.7 排除非化妆品引起的光感性皮炎。

5 处理原则

- 5.1 及时清除皮肤上存留的化妆品。
- 5.2 停止使用致病的化妆品,避免光照。
- 5.3 根据病情,按光感性皮炎对症治疗。