

ICS 11.020  
C 59



# 中华人民共和国国家标准

GB 15975—1995

---

## 淋病诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and management of gonorrhoea

1996-01-23 发布

1996-07-01 实施

---

国家技术监督局 发布  
中华人民共和国卫生部

# 中华人民共和国国家标准

## 淋病诊断标准及处理原则

GB 15975—1995

Diagnostic criteria and management of gonorrhoea

根据《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》特制定本标准。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了淋病的诊断标准及处理原则。

本标准适用于全国各级医疗保健机构、卫生防疫机构对淋病的诊断、报告和处理。

### 2 诊断标准

淋病必须根据病史、体检和实验室检查结果进行综合分析,慎重作出诊断。

#### 2.1 接触史

有婚外或婚前性行为,性伴感染史,或与淋病患者共用物品史,或新生儿的母亲有淋病史等。淋病潜伏期1~10天,平均为3~5天。

#### 2.2 临床表现

2.2.1 男性:尿痛、尿道口红肿、溢脓,可有尿急,尿频及伴有全身不适。

2.2.2 女性:白带增多、脓性;有腰痛、下腹痛、子宫颈红肿、宫颈口糜烂、有脓性分泌物。前庭大腺部位可发生红肿及疼痛。可有较轻的尿急、尿频、尿痛、尿道口红肿及脓性分泌物。幼女可有外阴阴道炎、外阴及肛门周围皮肤粘膜红肿,阴道溢脓。

2.2.3 有合并症的淋病,男性可出现前列腺炎、精囊炎、附睾炎、尿道狭窄;女性可出现输卵管炎、盆腔炎;严重时发生播散性感染,表现为寒战、高烧、皮疹、关节炎、心包炎、心内膜炎等全身症状。

#### 2.2.4 其他部位淋病:

淋菌性眼结膜炎:结膜充血水肿,有大量脓性分泌物。新生儿淋菌性结膜炎大部分是分娩时经患淋病的母亲产道所感染,多为双侧。成人结膜炎常是患者自身或性伴的泌尿生殖道淋球菌感染的分泌物,通过手指或毛巾等污染眼睛被感染,多为单侧。

淋菌性咽炎和直肠淋病与淋病患者有口交或肛交行为而感染。

#### 2.3 实验室检查

2.3.1 涂片:取尿道或宫颈脓性分泌物涂片作革兰染色,镜下可见大量多形核白细胞。多个多形核白细胞内可见数量多少不等的革兰阴性双球菌。此法对女性患者检出率低,可有假阴性,必要时应作培养。

2.3.2 培养:标本在选择性培养基上培养,可出现典型菌落。氧化酶试验阳性。取典型菌落作细菌涂片可见到革兰阴性双球菌。

诊断:根据2.1~2.3进行。

如标本取自生殖器以外部位、儿童或在法医学上有重要意义时,则必须对培养的菌株经糖发酵试验,荧光抗体试验进一步鉴定确证(见附录A)。

### 3 治疗原则

应遵循及时、足量、规则用药的原则,根据不同的病情采用相应的治疗方案(见附录B)。性伴如有感

国家技术监督局1995-12-15批准  
1996-07-01实施