

ICS 11.020
C 05
备案号:28834—2010

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS 320—2010

成人自发性脑出血诊断标准

Diagnostic criteria for spontaneous intracerebral hemorrhage in adults

2010-04-29 发布

2010-11-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 术语和定义	1
3 诊断依据	1
4 诊断	1
5 鉴别诊断	2
附录 A (资料性附录) 各部位脑出血的临床诊断要点	3
附录 B (资料性附录) 脑出血的常见病因及诊断线索	5
参考文献	6

前 言

本标准的附录 A、附录 B 是资料性附录。

本标准由卫生部医疗服务标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准主要起草单位：首都医科大学附属北京天坛医院。

本标准参与起草单位：复旦大学附属上海华山医院、中山医科大学附属第一医院、中国医学科学院北京协和医院、首都医科大学宣武医院。

本标准主要起草人：王拥军、崔丽英、董强、曾进胜、赵性泉、吴敌、王伊龙、王春雪、杜万良。

成人自发性脑出血诊断标准

1 范围

本标准规定了成人自发性脑出血的诊断依据、诊断、鉴别诊断。

本标准适用于全国各级医疗机构及其医务人员对成人自发性脑出血的诊断。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

成人自发性脑出血 intracerebral hemorrhage, ICH

非外伤引起的成人自发性脑实质内出血。

3 诊断依据

3.1 临床表现

3.1.1 发病形式

多数 ICH 患者于动态下急性起病；少数患者于静态下起病。

3.1.2 症状

患者发病时多表现为突发头痛、恶心、呕吐、一侧肢体无力、感觉异常、言语含糊或不能说话、大小便失禁、意识不清、颈项强直等症状，多数患者伴有血压升高；部分患者有癫痫发作。

3.1.3 体征

脑出血患者的临床表现取决于出血的部位、出血量和出血速度等。临床体征有偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲、眼球凝视麻痹、构音障碍、失语、不同程度的意识障碍、病理反射阳性、脑膜刺激征阳性等。病情危重者可表现为中度或重度昏迷，瞳孔不等大或针尖样，生命体征不稳定，并在数小时至数天内死亡。少数病人可无明显神经系统定位体征。

3.2 影像学

首选头部 CT 检查，以明确诊断。必要时可行头部 MRI 检查协助诊断。

3.3 实验室和其他辅助检查

包括：血常规、尿常规、血糖、电解质、肝功能、肾功能、凝血功能、心电图、胸部 X 线等检查。

4 诊断

4.1 疑似 ICH：3.1.1+3.1.2+3.1.3。各部位脑出血的临床诊断要点参见附录 A，脑出血的常见病